



Căpșun în câmp

Knowledge grows



Pre Planting

Vegetative Growth

Flowering

Fruit Set

Mid Fruit Growth

Fruiting / Post Harvest

YaraMila™

YaraMila Complex
CROPCARE
150-200 kg/ha

YaraVita™

BORTRAC - 2 l/ha
BUD BUILDER - 5 l/ha
ZINTRAC 700 - 0,5 l/ha

STOPIT 3 aplicări a câte 10 l/ha sau 6 aplicări a câte 5 l/ha la interval de 7-10 zile

BORTRAC - 2 l/ha
BUD BUILDER - 5 l/ha
ZINTRAC 700 - 0,25 l/ha

YaraVita™

KOMBIPHOS - 5 l/ha
COPTRAC 500 - 0,5 L/ha

SENIPHOS

30 l/ha în 3-6 aplicări la interval de 7-14 zile

YaraLiva™

NITRABOR / TROPICOTE
75-100 kg/ha

CALCINIT (15.5% N 26.3% CaO) 6.25kg / 250l soluție
125-150 kg/ha începând cu luna Mai, alternativ la fiecare a doua udare (25kg/ha la 4-7 zile)

YaraTera™

REXOLIN Fe: D12 (pH<6,5)
Fertirigare 30 kg/ha ***
Foliar conc. 0,1%

KRISTA K PLUS (13.7% N 46.3% K2O), KRISTA MAG (11% N 15% MgO) - 6.25kg / 250l soluție

YaraTera™

KRISTALON SCARLET (7.5-12-36) - 6.25kg / 250l soluție
REXOLIN Q15 (7% Fe) 3,5 kg / 250 litri soluție

Analytical Tools

MEGALAB
Determinarea deficiențelor din sol și analiza apă

MEGALAB și CheckIT App
Determinarea deficiențelor, analize de țesut de plante

Citiți eticheta produsului YaraVita înainte de aplicare

■ Fert-irigare
 ■ Fertilizare cu granule
 ■ Fertilizare foliară
 ■ Instrumente de analiză

Recomandările se bazează pe experiența în teren și rezultatele studiilor ale Yara

Disclaimer: Informațiile conținute aici sunt cele orientative și fac parte din cercetările lui Yara.

Este posibil ca recomandările să fie modificate pentru a se asigura că acestea respectă calculele Nmax. și NVZ, dacă este cazul.

*** Udare suficientă cât să patrundă în sol minim 10 cm