



Knowledge grows

Căpșun în câmp



Înainte de plantare

Creștere Vegetativă

Înflorire

Formare fruct

Mijlocul fructificării

Coacere și după recoltare

YaraMila™

YaraMila
COMPLEX / CROPCARE
150-200 kg/ha

YaraMila
COMPLEX / CROPCARE
250 kg/ha

YaraVita™

BORTRAC - 2 l/ha
FRUTREL - 3 l/ha
ZINTRAC 700 - 0,5 l/ha

STOPIT
3 aplicări a câte 5- 10 l/ha s la interval de 7-10 zile

BORTRAC - 2 l/ha
BUD BUILDER - 5 l/ha
ZINTRAC 700 - 0,25 l/ha

YaraVita™

KOMBIPHOS - 5 l/ha
COPTRAC 500 - 0,5 l/ha

SENIPHOS
30 l/ha în 3-6 aplicări la interval de 7-14 zile

YaraLiva™

NITRABOR / TROPICOTE
75-100 kg/ha

YaraTera™

REXOLIN Fe: D12 (pH<6,5)
Fertirigare 30 kg/ha ***
Foliar conc. 0,1%

KRISTALON
Yellow / Blue Label
15 kg/ha cu reptare la 7 zile

KRISTALON
RED label
20 kg/ha cu reptare la 7 zile

KRISTALON
Orange
15 kg/ha cu repetare la 7 zile

KRISTALON
Yellow / Blue Label
15 kg/ha cu repetare dupa fiecare cules

YaraTera™

CALCINIT
10kg/ha cu repetare la 7 zile

KRISTA MAG
10kg/ha cu repetare la 7 zile

CALCINIT
10kg/ha cu repetare la 7 zile

Analytical Tools

MEGALAB
Determinarea deficiențelor din sol și analiza apă

MEGALAB și CheckIT App
Determinarea deficiențelor, analize de țesut de plante

Fert-Irigare

Fertilizare cu granule

Fertilizare foliară

Instrumente de analiză

Citiți eticheta produsului YaraVita înainte de aplicare

Recomandările se bazează pe experiența în teren și rezultatele studiilor ale Yara

Disclaimer: Informațiile conținute aici sunt cele orientative și fac parte din cercetările lui Yara.

Este posibil ca recomandările să fie modificate pentru a se asigura că acestea respectă calculele Nmax. și NVZ, dacă este cazul.

*** Udare suficientă cât să patrundă în sol minim 10 cm